

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
Южный Научный Центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES  
Southern Scientific Centre




Кавказский  
Энтомологический  
Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 2. Вып. 1

Vol. 2. No. 1



Ростов-на-Дону  
2006

## Пауки (Aranei) семейств Philodromidae и Thomisidae равнин Ставропольского края

## Spiders (Aranei) families Philodromidae and Thomisidae plains of Stavropol Province

Т.В. Ханов<sup>1</sup>, А.В. Пономарёв<sup>2</sup>  
T.V. Khanov<sup>1</sup>, A.V. Ponomarev<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ставропольский государственный университет, ул. Пушкина, 1, Ставрополь 355009 Россия

<sup>2</sup>Южный научный центр РАН, ул. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия

<sup>1</sup>Stavropol State University, Pushkin str., 1, Stavropol 355009 Russia

<sup>2</sup>South Scientific Centre RAS, Tchekhov str., 41, Rostov-on-Don 344006 Russia

**Ключевые слова:** пауки, Philodromidae, Thomisidae, Ставропольский край

**Key words:** Aranei, Philodromidae, Thomisidae, Stavropol Province

**Резюме.** Приводится список 22 видов пауков семейств Philodromidae и Thomisidae равнин и предгорий Ставропольского края.

**Abstract.** The list of 22 species of spiders of families Philodromidae and Thomisidae plains and foothills of Stavropol Province is resulted.

Обработана коллекция пауков семейств Philodromidae и Thomisidae, собранных Т.В. Хановым и Е.В. Хомченко (в тексте Т.Х. и Е.Х. соответственно) в 2000-2005 годах в равнинных и предгорных районах края. Ниже приводится список зарегистрированных видов.

### Семейство PHILODROMIDAE

*Paratibellus oblongiusculus* (Lucas, 1846) – 1♂, 1♀, Апанасенковский р-н, с. Манычское, берег оз. Маныч-Гудило, 31.05.2005 (Т.Х.).

*Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802) – 1♀, Сенгилеевская котл., степь, 11.06.2000 (Т.Х.); 1♂, Ставрополь, дача, 22.06.2003 (Т.Х.); 2♂ с. Манычское, берег оз. Маныч-Гудило, 24-31.05.2005 (Т.Х.); 1♀, там же, оспенный луг с тамариксом (*Tamarix* sp.), 29.05.2005 (Е.Х.); 1♂, там же, пшеничное поле, 2.06.2005 (Т.Х.).

*Philodromus dispar* Walckenaer, 1826 – 1♂, Георгиевский р-н, пос. Приэтокский, разнотравье, 5.06.2003 (Т.Х.); 1♀, Ставрополь, 15.06.2003 (Т.Х.).

*Philodromus rufus* Walckenaer, 1826 – 1♂, пос. Приэтокский, сад, в травостое, 2.06.2003 (Е.Х.)

*Philodromus glaucinus* Simon, 1870 – 1♂, 2♀, с. Манычское, луг на берегу оз. Маныч-Гудило, 24-31.05.2005 (Т.Х.).

*Philodromus histrio* (Latreille, 1819) – 1♀, Нефтекумский р-н, с. Удуби-Юрт, 28.07.2003 (Т.Х.); 4♂, 17♀, с. Манычское, берег оз. Маныч-Гудило, 24-31.05.2005 (Т.Х.); 4♀, там же, лесополоса, 26.05.2005 (Т.Х.).

*Thanatus arenarius* Thorell, 1872 – 1♂, Апанасенковский р-н, с. Белые Копани, 29.05.2004 (Т.Х.); 1♀, с. Манычское, вблизи оз. Маныч-Гудило, 4.07.2003 (Т.Х.); 3♂, 1♀, там же, 24-31.05.2005 (Т.Х.); 2♀, там же, лесополоса, 25.05.2005 (Т.Х.).

*Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802) – 2♂, Сенгилеевская котл., степь, 11.06.2000 (Т.Х.); 1♂, пос. Приэтокский, 5.03.2003 (Т.Х.); 9♂, 5♀, с. Манычское, берег оз. Маныч-Гудило, 24-31.05.2005 (Т.Х.); 19♂, 9♀ там же, лесополоса, 25.05.2005 (Т.Х.).

### Семейство THOMISIDAE

*Heriades oblongus* Simon, 1918 – 2♂ с. Манычское, вблизи оз. Маныч-Гудило, 31.05.2005 (Т.Х.).

*Misumena vatia* (Clerck, 1758) – 1♂, Ставрополь, дачный массив, 30.09.2000 (Т.Х.); 1♂, Михайловск, травостой, 10.09.2004 (Т.Х.); 3♂, 1♀, Петровский район, с. Гофицкое, степь, 18-29.06.2005 (Е.Х.).

*Misumenops tricuspидata* (Fabricius, 1775) – 1♂ Ставрополь, дачный массив, на укропе (*Anethum graveolens* Linnaeus), 18.08.2000 (Т.Х.); 1♀, там же, Русский лес, 9.07.2003 (Т.Х.); 4♂, Сенгилеевская котл., разнотравная степь, 17.09.2000 (Т.Х.); 1♂, Труновский р-н, с. Донское, разнотравная степь, 22.09.2000 (Т.Х.); 3♂, пос. Приэтокский, разнотравье, 5.06.2003 (Т.Х.); 1♂, Михайловск, травостой, 10.09.2004 (Т.Х.); 2♂, 2♀, с. Манычское, луг, 24.05.2005 (Т.Х.); 2♂, 8♀, там же, лесополоса, 25.05.2005 (Т.Х.).

*Ozyptila blackwalli* Simon, 1875 – 1♂, Ставрополь, Русский лес, 23.06.2000 (Т.Х.).

*Ozyptila praticola* (C.L. Koch, 1837) – 1♀, Ставрополь, дачный массив, на малине, 4.06.2000 (Т.Х.).

*Ozyptila scabricula* (Westring, 1851) – 1♀, с. Манычское, 25-30.05.2005 (Т.Х.).

*Pistius truncatus* (Pallas, 1772) – 1♀, окр. оз. Кравцово, пар, 13.06.2000 (Т.Х.).

*Runcinia lateralis* (C.L. Koch, 1838) – 1♂, 20 км северо-восточнее Ставрополя, степь, 19.07.2000 (Т.Х.); 1♂, Ставрополь, дача, 22.05.2003 (Т.Х.); 2♂, там же, 3.07.2005 (Е.Х.).

*Synema globosum* (Fabricius, 1775) – 1♀, берег Сенгилеевского вдхр., 23.06.2000 (Т.Х.); 1♂, 1♀, пос. Приэтокский, разнотравье, 5.06.2003 (Т.Х.); 1♂, с. Гофицкое, 29.06.2005 (Е.Х.).

*Thomisus albus* (Gmelin, 1789) – 1♂, с. Белые Копани, 29.05.2004 (Т.Х.); 2♂, 2♀, с. Манычское, берег оз. Маныч-Гудило, 24-31.05.2005 (Т.Х.); 3♂, 1♀, там же, лесополоса, 26.05.2005 (Т.Х.); 2♂, 1♀, с. Гофицкое, 18-29.06.2005 (Е.Х.).

*Xysticus cristatus* (Clerck, 1758) – 3♂, с. Манычское, лесополоса, 25.05.2005 (Т.Х.); 1♀, там же, берег оз. Маныч-Гудило, 31.05.2005 (Т.Х.).

*Xysticus kochi* Thorell, 1872 – 1♀, пос. Приэтокский, 5.06.2003 (Т.Х.); 1♂, 1♀, с. Белые Копани, 2.06.2004 (Т.Х.); 12♂, 8♀, с. Манычское, лесополоса, 25.05-2.06.2005 (Т.Х.); 5♂, 10♀, там же, берег оз. Маныч-Гудило, 24-31.05.2005 (Т.Х.).

*Xysticus lanio* C.L. Koch, 1845 – 1♂, 1♀, Ставрополь, Чинский лес, 7.05.2000 (Т.Х.).

*Xysticus striatipes* L. Koch, 1870 – 2♂, Сенгилеевская котл., разнотравная степь, 17.09.2000 (Т.Х.); 2♂, 2♀, с. Донское, степь, 22.09.2000 (Т.Х.); 1♂, 2♀, 20 км северо-восточнее Ставрополя, степь с преобладанием злаков, 28.10.2000 (Т.Х.).